CANNA DA ZUCCHERO

(Saccharum officinarum L.)

Dr. Domico Grgić

Preparazione del materiale da piantare

Nonostante il fatto che si tratti del materiale da piantare attecchito o meno, prima di piantarlo è obbligatorio tenerlo sommerso per *15–20 min* nella soluzione acquosa di **AGROSTEMIN**® (anche insieme all prodotto disinfettante)

- *3,0g di* **"profi"** *(30g di* **"verde"***) in 100l d'acqua.*

Produzione del materiale da piantare

Che si effetui negli apposti contenitori (es. buste di PVC) o sulle apposite superfici, dopo la piantagione:

- *spruzzarlo con 30 g/ha di* **"profi"** *(300 g/ha di* **"verde"**) *o*
  annaffiarlo con la soluzione acquosa di 3,0g di **"profi"** *(30g di* **"verde"***) in 1000l.*

Nel corso della vegetazione

All'inizio della stagione

Prima – qualora non sia precedentemente effettuata la sommersione delle piantine, 7-10 giorni dopo la piantagione, cioè

Seconda e ogni successiva – prima dell'apparizione dei boccioli:

- *spruzzare con 30 g/ha di* **"profi"** *(300 g/ha di* **"verde"***).*

Durante la stagione

I spruzzatura all'inizio della fase dell'accestimento ("Tillering Phase")– prima dell'inizio dell'accestimento.

- *spruzzare con 30–150 g/ha di* **"profi"** *(300–1.500 g/ha di* **"verde"***).*

II spruzzatura all'inizio della fase dello sviluppo intenso del raccolto ("Grand Growth Phase")

- *spruzzare con 30–150 g/ha di* **"profi"** *(300–1.500 g/ha di* **"verde"***).*

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione di altri prodotti chimici di protezione, spruzzare con 15 g/ha di **"profi"** (o 150 g/ha di **"verde"**) per il recupero migliore.

AGROSTEMIN

Dr. Domico Gajić

EFFETTO

Sul materiale da piantare

– energia aumentata dello sboccio di boccioli,
– percentuale maggiore del materiale da piantare che si è radicato bene,
– radicamento migliore – sistema delle radici forte e molto sviluppato,
– crescita iniziale più veloce e più uniforme,
– maggiore resistenza alle malattie e parassiti,
– presenza maggiore del materiale di I classe da piantare.

Nella vegetazione

– trapianto migliore – ricezione di suoli e piantine,
– radicamento con più successo,
– crescita iniziale più veloce e più uniforme,
– accestimento più abbondante,
– maggior numero di gemme forti e più produttive,
– aumento di clorofilla,
– superficie delle foglie più grande,
– maggiore resistenza alle malattie e parassiti.

Qualità biologica

– rendimento aumentato di zucchero polarizzato all'ettaro,
– aumento di valore del quoziente di maturità,
– aumento di valore del quoziente di succo pressato,
– aumento di digestione,
– aumento del contenuto di K nel succo pressato,
– riduzione del contenuto di α azoto amminico nel succo pressato.

Nota: Quando viene determinato il momento dell'inizio della mietitura, oltre ai metodi già provati, usare anche i metodi che si fondano sulla determinazione della quantità reale di zucchero nella canna (sotto l'influenza di Agrostemin, lo stato delle foglie non è più criterio affidabile).

AGROSTEMIN® è compatibile con tutti gli altri prodotti che vengono applicati in agricoltura tramite la sospensione acquosa – non richiede il passaggio separato.

È completamente innocuo agli uomini, animali (incluse le api) e ambiente;
non sono previste le misure particolari della protezione igienico-tecnica*)

AGROSTEMIN® è un prodotto per alimentazione d'origine naturale
che contiene gli estratti vegetale**)

*) Decisione n. 3/2-08-9291/02 dell'13 gennaio 2003 Segretariato federale di lavoro, sanità e previdenza sociale
**) Decisione n. 321-01-02214/2019-11 dell'10 febraio 2020 Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia