


**EFEITO FOLIAR DA APLICAÇÃO DE AGROSTEMIN®
EM VIVEIROS DE PIMENTA**
(Capsicum annuum)





COM AGROSTEMIN

SEM AGROSTEMIN



COM
AGROSTEMIN


SEM
AGROSTEMIN

**FLORAÇÃO E
FRUTIFICAÇÃO**

SEM AGROSTEMIN



COM AGROSTEMIN



COM AGROSTEMIN

SEM AGROSTEMIN

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajic


COM
AGROSTEMIN


SEM
AGROSTEMIN











ALTURA DA 1ª BIFURCAÇÃO

SEM AGROSTEMIN

COM AGROSTEMIN


22,5cm

24cm

26,5cm

27cm






COM AGROSTEMIN

SEM AGROSTEMIN

VISTA à distância



SEM AGROSTEMIN



COM AGROSTEMIN



DADOS DE PRODUÇÃO

Amostra	Época	Agrostemin		Ganho
		Com	Sem	
Amostra 01	Primeira colheita	9 caixas	6 caixas	50%
Amostra 02	83 dias após o transplântio	67 caixas	48 caixas	40%
Amostra 03	90 dias após o transplântio	47 caixas	34 caixas	38%
TOTAL		123 caixas	88 caixas	40%

Ganho médio de 40%



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com