

EXPERIMENTO SOBRE O EFEITO DO AGROSTEMIN® APLICADO NO PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR (*Saccharum officinarum* L.)

– demonstração de experiências nas plantações "Colonial"* –



* fabricante de bebidas alcoólicas

Área sulcada e a cana-planta destribuída para início do plantio



Preparo das soluções de **AGROSTEMIN®**
3g/100 litros de água para imersão dos
colmos por 20 minutos

AGROSTEMIN®



Dr. Danilo Gaião



Área plantada



FEVEREIRO DE 2010



Aplicação do produto sobre os colmos
junto com a calda cupinicida após o plantio.





SEM AGROSTEMIN®




COM AGROSTEMIN®

AGOSTO DE 2010



SEM
AGROSTEMIN

COM
AGROSTEMIN®



SEM AGROSTEMIN

COM AGROSTEMIN®

Sete meses após plantio e aplicação.



COM ADUBO

COM AGROSTEMIN®
SEM ADUBO

DEZEMBRO DE 2009

AVALIAÇÃO DO PONTO DE COLHEITA EM JANEIRO DE 2010



AVALIAÇÃO FINAL

PESO ESTIMADO PARA UM HECTARE (tonelada)

AGROSTEMIN	106,94
TESTEMUNHA	85,48
Ganho	21,5 t/ha
	25,1 %

ANÁLISE DE QUALIDADE

Tratamento	P.C.	A.T.R.	BRIX	PUREZA
AGROSTEMIN	15,2521	148,40	20,40	90,44
TESTEMUNHA	14,4411	142,14	20,70	84,15
G A N H O	5,6 %	4,4 %	-1,4 %	7,5 %



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com