

**EFFECTOS DEL USO FOLIAR DE AGROSTEMIN®  
EN LAS PLANTAS DE CEBOLLA**  
– observaciones fenológicas –



*( Allium cepa )*



**NO TRATADAS**

**TRATADAS**





**NO TRATADAS**

**TRATADAS**

**CONTROL**

**TRATADAS**



## CONTROL

## AGROSTEMIN



El oscurecimiento del color de las raíces indica que solo partes superiores, aquellos de color blanquecino, son capaces de continuar su desarrollo.

La superficie de color blanco de la raíz, indica que todavía no se ha desarrollado en su totalidad y que continuará este proceso.



**CONTROL**

**AGROSTEMIN**



**CONTROL**

**AGROSTEMIN**

## CATEGORIZACIÓN DE LA CABEZAS

La cebolla es seleccionada de acuerdo a su tamaño en las siguientes categorías: Tipo 01 – pequeñas, Tipo 02 – medianas, Tipo 03 – grandes y Tipo 04 – extra grandes. El efecto financiero del productor depende directamente del rendimiento total de las estructuras individuales categorizadas, siendo la categoría Tipo 03 la más frecuente.



**TIPO 1**  
( pequeñas )

**TIPO 2**  
( medianas )


**TIPO 3**  
( grandes )

**TIPO 3**  
( grandes )



**CONTROL**

**CON**  
**AGROSTEMIN®**



**AGROSTEMIN**<sup>®</sup>



*Dr. Danilo Gajić*

**[www.agrostemin.com](http://www.agrostemin.com)**