

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajić





C V E Ć A R S T V O

R U Ž A (Rosa L.)

Proizvodnja podloga

Iz semena

- Način primene, vreme i količina
 - ❖ u pripremi za setvu – prašak
pre odlaganja u pesak, seme pomešati sa 30 g/ha "profi"*
 - ❖ nega sejanaca (prva–druga godina) vodenom suspenzijom
 - prvi put* – sa 30 g/ha "profi" (300 g/ha "zelenog")
po otvaranju lisnih pupoljaka
 - drugi put* – istom količinom u vreme pred uobičajeno za cvetanje
 - treći put* – krajem sezone (duplu dozu)
 - ❖ vađenje i presađivanje
*potopiti u vodeni rastvor 1,5g "profi" (15g "zelenog")
na 10l vode*

Reznicama (ožiljavanje)

- Način primene, vreme i količina
*reznice potopiti u vodeni rastvor 1,5g "profi" (15g "zelenog")
na 10l vode i/ili prpilište (korenilište) zaliti sa 30 g/ha "profi"
(300 g/ha "zelenog")*

Efekti

- bolja klijavost i energija klijanja
- bolje ukorenjavanje – snažan neuobičajeno razvijen korenov sistem
- bujnije bokorenje
- veći broj snažnih, dužih izbojaka
- veća zastupljenost sadnog materijala I klase
- uspešnije prezimljavanje

* na količinu semena planiranu za zasejavanje jednog hektara



Proizvodnja sadnica (kalemova)

Način primene, vreme i količina

- ❖ vađenje i presađivanje sejanaca/ožiljenih reznica
pre sadnje držati potopljene u rastvoru 1,5g "profi" (15g "zelenog") na 10l vode
- ❖ nega presađenih sejanaca/ožiljenih reznica
prvi put – po izbijanju lisnih pupoljaka zaliti / isprskati sa 30 g/ha "profi" (300 g/ha "zelenog")
drugi put – pred kalemljenje podloge zaliti / isprskati sa 30 g/ha "profi" (300 g/ha "zelenog")
- ❖ kalemljenje
priprema grančica za kalemljenje – držati ih potopljene u rastvoru 1,5g "profi" (15g "zelenog") na 10l vode ili krpu u kojoj se čuvaju do kalemljenja ovlažiti navedenom suspenzijom
- ❖ nega kalema–sadnica
po formiranju lisne mase na kalemima, odnosno, bilo u vreme prvog prehranjivanja ili prskanja zaštitnim sredstvima, zaliti sa 30 g/ha "profi" (300 g/ha "zelenog")
- ❖ priprema za vađenje i presađivanje/prezimljavanje
u sklopu uobičajenih mera koje se sprovode u cilju uspešnijeg prezimljavanja prskati sa 60 g/ha "profi" (600 g/ha "zelenog")
- ❖ pakovanje za transport
masu kojom je sadnici obezbeđena vlaga tokom transporta navlažiti rastvorom 1,5g "profi" (15g "zelenog") na 10l vode

Efekti

- uspešnije presađivanje – prijem podloga i sadnica
- veći procenat kalema koji su se primili
- bujnije bokorenje
- veći broj snažnih izbojaka
- zadebljali vrat korena
- veća zastupljenost sadnog materijala I klase
- pogodnija za transport i čuvanje
- uspešnije prezimljavanje



Proizvodnja rezanog cveta

Način primene, vreme i količina

- prijem i odlaganje sadnica do trenutka sadnje
po preuzimanju, držati ih potopljene u rastvoru 1,5g "profi" (15g "zelenog") na 10l vode radi oporavka
- sa 30 g/ha "profi" (300 g/ha "zelenog") zaliti
 - ❖ kad krenu da se otvaraju lisni pupoljci
 - ❖ pred cvetanje, odnosno, po formiranju lisne mase
 - ❖ istovremeno sa prihranjivanjem i sa sredstvima za zaštitu (pola od preporučene doze)
 - ❖ nakon rezanja cveta
 - ❖ pri kraju vegetativne sezone (bolje prezimljavanje)

Efekti

- uspešnije ukorenjavanje
- bujnije bokorenje i cvetanje
- veći broj snažnih izbojaka
- veći procenat cvetova sa dužom i snažnijom drškom
- intenzivnija boja i miris
- pogodnija za transport i čuvanje
- uspešnije prezimljavanje

AGROSTEMIN® je kompatibilan sa svim sredstvima koja se primenjuju u poljoprivredi putem vodene suspenzije – ne zahteva zaseban prolaz.

Potpuno je bezopasan za ljude, životinje (uključujući i pčele) i prirodnu sredinu; ne zahteva posebne mere HTZ*)

AGROSTEMIN® je sredstvo za ishranu bilja na bazi biljnih ekstrakta**)

*) Rešenje br 3/2-08-9291/02 od 13.01.2003. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje

**) Rešenje br 321-01-02214/2019-11 od 10.02.2020. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RSrbije